



Réhabilitation d'un cheval négligé (« Rescue »): Il s'agit d'une cause importante. Vous pouvez aider.

Le Canada compte aujourd'hui un grand nombre de chevaux négligés. Cette situation a été exacerbée par la crise économique passée qui a poussé de nombreux propriétaires de chevaux à abandonner ceux qu'ils n'avaient plus les moyens de garder. Parmi les autres raisons courantes de l'abandon ou de la négligence des chevaux figurent la maladie (du propriétaire ou du cheval), les blessures subies par le cheval, la vieillesse et les chevaux mal dressés qui représentent une menace pour les autres ou deviennent un fardeau. Les chevaux négligés peuvent avoir n'importe quel âge et n'importe quel niveau d'entraînement ou de formation. Si vous avez pris la décision de réhabiliter un cheval négligé, nous avons rassemblé quelques étapes et considérations importantes pour vous aider.

Obtenir une vue d'ensemble de l'état du cheval

La première chose à faire est de demander à un vétérinaire de procéder à un examen physique complet de votre cheval afin de déceler les problèmes immédiats et de vérifier son état de santé général. Cet examen révélera s'il s'agit d'une maladie grave nécessitant des soins et un traitement plus poussés.



Connaître la condition de chair (ou cote de chair) de votre cheval

La condition de chaire est un indicateur important des mesures de rééducation dont votre cheval peut avoir besoin. [Déterminez la condition de chair de votre cheval à l'aide du système Henneke pour comprendre la gravité de sa perte de poids.](#) Le conseiller Purina de votre région peut vous fournir des cartes d'évaluation de la condition de chaire pour vous aider dans cette évaluation.

Peser votre cheval sans balance.

À l'aide d'un ruban de poids pour chevaux, mesurez en pouces le tour de poitrine de votre cheval. Mesurez en travers de la partie la plus haute du garrot et maintenez le ruban aussi près que possible des coudes. Ensuite, à deux, mesurez en pouces la longueur du corps de votre cheval depuis la pointe de l'épaule, en ligne droite le long du flanc du cheval, jusqu'à la pointe de la fesse ou du pli. En fonction de l'âge de votre cheval, utilisez l'une des équations suivantes pour estimer son poids.

- Cheval adulte : $(\text{Tour de sangle} \times \text{Tour de sangle} \times \text{Longueur du corps}) \div 330 = \text{Poids du corps en livres}$
- Yearling : $(\text{Tour de sangle} \times \text{Tour de sangle} \times \text{Longueur du corps}) \div 301 = \text{Poids corporel en livres}$
- Sevré : $(\text{Tour de sangle} \times \text{Tour de sangle} \times \text{Longueur du corps}) \div 280 = \text{poids corporel en livres}$

Votre poids corporel total en livres peut être divisé par 2,2 pour obtenir le poids corporel en Kilogrammes.

Un régime alimentaire adapté peut faire une grande différence.

Chevaux mal nourris

Les chevaux ayant une condition de chaire de 3 ou plus peuvent normalement être amenés à une condition de chaire cible de 5 en six à huit semaines. Ces chevaux doivent recevoir une alimentation équilibrée représentant 1,5 % de leur poids corporel en quatre ou cinq repas par jour. Un régime équilibré se compose de 50 % de foin de bonne qualité et de 50 % d'aliments concentrés. La quantité totale d'aliments peut être progressivement augmentée jusqu'à 2,5-2,8 % du poids corporel, le foin étant donné à volonté et le grain étant donné deux ou trois fois par jour (avec un maximum de 0,5 % du poids corporel par repas).


Les moulées complètes, telles qu'Évolution Senior, SuperFibre Intégri-T et Xcel HD, sont bien adaptées à l'alimentation des chevaux négligés en raison de leur amidon contrôlé et de leur haute digestibilité. En outre, les chevaux négligés manquent souvent de sel. C'est pourquoi le sel doit être introduit progressivement, à raison de 25 grammes par jour pour un cheval de taille moyenne, puis augmenté graduellement jusqu'à 50 grammes par jour. De l'eau fraîche et propre doit être disponible à tout moment.

Chevaux affamé

Les chevaux ayant une condition de chaire de 1 ou 2 ont souvent été victimes d'une véritable famine. Ces situations surviennent généralement après 60 à 90 jours sans nourriture ou, plus souvent, après trois à quatre mois avec de l'eau et du fourrage de très mauvaise qualité. Les chevaux dans cette situation sont souvent hypoglycémiques et hyperkaliémiques en raison de la perte de masse musculaire et de graisse. Si le cheval est capable de se lever et a perdu moins de 45 à 50 % de son poids corporel, il peut normalement être réhabilité. S'il a perdu 45 à 50 % de son poids corporel et qu'il n'est pas capable de se lever, il faut savoir que les chances de réussite de la réhabilitation peuvent être considérablement réduites.

Option foin de luzerne

Pour un cheval avec une condition de chaire de 3 ou plus, le foin de luzerne de qualité est une bonne base pour un régime riche en protéines et pauvre en amidon. Il convient de donner fréquemment de petites quantités de foin de luzerne de qualité, en augmentant lentement la quantité de luzerne à chaque repas. Le nombre de repas doit diminuer progressivement sur une période de 10 jours, et après 10 à 14 jours, le cheval peut être nourri à volonté. Si les dents du cheval sont en mauvais état, il est possible d'utiliser des cubes ou des granulés de luzerne, tels que Super Fibra Classic ou Nature, et de les faire tremper avant de les donner.



Option d'alimentation pour chevaux âgés

Les moulées pour chevaux âgés contenant un amidon contrôlé, des acides aminés ajoutés, des prébiotiques, des probiotiques, des oligo-éléments équilibrés et des vitamines sont la meilleure option pour donner à un cheval négligé les nutriments dont il a besoin. L'aliment doit être introduit à un taux de 0,5 % du poids corporel en plusieurs petites quantités par jour. Sur une période de 10 à 14 jours, la quantité de moulée doit augmenter lentement par repas, tandis que le nombre de repas diminue graduellement. À la fin de cette période, le cheval devrait avoir un taux d'alimentation normal, conformément aux instructions d'alimentation. L'aliment peut également être trempé dans de l'eau chaude pendant 15 minutes pour former une bouillie pour les chevaux ayant une mauvaise dentition. Il est important de faire tremper la moulée avant de la servir, mais pas pendant la nuit, car elle se dessècherait.

Soins supplémentaires nécessaires pour faciliter le rétablissement

- **Vermifugation**

En collaboration avec votre vétérinaire, une fois que votre cheval a atteint un poids et une condition physique suffisants pour être vermifugé, un traitement larvicide contrôlant les strongles, les ascaris et les oxyures peut être utilisé. Votre vétérinaire pourra élaborer un programme de contrôle des parasites.

- **Vaccinations**

Souvent, les antécédents médicaux des chevaux négligés sont inconnus, et les informations relatives aux vermifuges et aux vaccinations antérieures ne sont pas disponibles. En collaboration avec votre vétérinaire, votre cheval peut être vacciné contre les maladies endémiques de votre région géographique.

- **Soins des sabots**

Normalement, le soin des sabots implique des visites du maréchal-ferrant toutes les quatre à huit semaines, mais pour un cheval négligé, des problèmes particuliers peuvent nécessiter des mesures spéciales avec des calendriers plus courts. Il est impératif de travailler en étroite collaboration avec un maréchal-ferrant crédible, en particulier pour répondre aux besoins spécifiques des chevaux négligés ayant reçu peu de soins auparavant. Des radiographies de tous les sabots peuvent s'avérer nécessaires pour détecter d'éventuelles lésions internes et pour établir un plan de traitement des angles et de parage. Il est à noter que les chevaux négligés doivent avoir un poids suffisant pour supporter les soins du maréchal-ferrant (l'état de préparation peut être déterminé par votre maréchal-ferrant). Les chevaux négligés auront besoin d'un programme de soins des sabots à long terme. Comme la capsule du sabot se régénère, un sabot sain peut pousser en moins d'un an si l'alimentation et les soins vétérinaires sont adéquats. N'oubliez pas qu'une ration équilibrée contribue à l'amélioration de la qualité des sabots, mais qu'il faut plusieurs mois pour y parvenir. L'utilisation de suppléments pour sabots, tels que BMZ, doit être associée à une alimentation équilibrée.

Informations et ressources supplémentaires.

Il est essentiel que les personnes souhaitant aider ces chevaux à risque comprennent bien les besoins spécifiques de ces animaux et les mesures à prendre pour les réhabiliter. Avec une alimentation, des soins vétérinaires et des soins appropriés, vous pouvez donner à un cheval négligé une seconde chance de mener une vie saine et productive..